

VOUS SOUHAITEZ PRENDRE UN MÉDICAMENT VASOCONSTRICTEUR CONTRE LE RHUME ? RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES

- ✓ La posologie de votre médicament [.....] est de comprimé(s) par jour et le soir
- ✓ Ne pas prendre pendant plus de 5 jours
- ✓ Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 15 ans
- ✓ Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou au cours de l'allaitement
- ✓ Ne pas associer avec un autre médicament contenant un autre vasoconstricteur (par voie orale ou nasale)
- ✓ Ne pas associer avec un autre médicament contenant du paracétamol, de l'ibuprofène ou de la cétirizine



En cas de doute, consultez la notice du médicament

Si les symptômes persistent ou en cas d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, consultez un médecin

➔ Pour vous informer sur les médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

➔ Pour déclarer tout effet indésirable : www.signalement-sante.gouv.fr

Contre le rhume et sa rechute, pensez à :



Vous laver les mains régulièrement



Utiliser un mouchoir à usage unique



Tousser et éternuer dans votre coude




Porter un masque jetable lorsque vous êtes malade

Suivez-nous sur @ansm ansm.sante.fr

ansm

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé



CONSEILS & PRÉVENTION

VOUS AVEZ UN RHUME : QUE FAIRE ?

Conseils pratiques et précautions à prendre vis-à-vis de certains médicaments contre le rhume



BON À SAVOIR

Le rhume guérit spontanément en 7 à 10 jours **SANS TRAITEMENT**



QUE FAIRE POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT ?

- ☑ **Humidifiez l'intérieur de votre nez** avec des solutions de lavage adaptées : sérum physiologique, sprays d'eau thermale ou d'eau de mer...
- ☑ **Buvez suffisamment**
- ☑ **Dormez la tête surélevée**
- ☑ **Veillez à maintenir une atmosphère fraîche** (18-20°C) et aérez régulièrement les pièces

À éviter : les climatiseurs qui déshumidifient l'air et assèchent les muqueuses nasales, fumer et respirer la fumée des autres

Si ces gestes n'améliorent pas vos symptômes, demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre un médicament contre le rhume



Informations importantes à connaître avant de prendre un vasoconstricteur

Un vasoconstricteur est un médicament qui vise à décongestionner le nez. Il est souvent associé à un antalgique (paracétamol, ibuprofène) ou à un antihistaminique (cétirizine).



MÉDICAMENTS CONCERNÉS

- | | |
|--|--|
| ◆ Actifed Lp Rhinite Allergique | ◆ Humex Rhume |
| ◆ Actifed Rhume | ◆ Nurofen Rhume |
| ◆ Actifed Rhume jour et nuit | ◆ Rhinadvil Rhume Ibuprofène/
Pseudoéphédrine |
| ◆ Dolirhume Paracétamol et Pseudoéphédrine | ◆ Rhinadvilcaps Rhume Ibuprofène/
Pseudoéphédrine |
| ◆ Dolirhumepro Paracétamol Pseudoéphédrine et Doxylamine | ◆ Rhinureflex |
| | ◆ Rhumagrip |



LES VASOCONSTRICTEURS EXPOSENT AUX RISQUES SUIVANTS

- | | |
|---|--|
| ◆ Accident vasculaire cérébral (AVC) : déformation de la bouche, faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambe, troubles de la parole, troubles de l'équilibre, maux de tête intenses ou baisse de la vision | ◆ Tension artérielle élevée |
| ◆ Troubles cardiaques tels qu'un infarctus du myocarde : douleur thoracique comme un étau qui peut s'étendre dans les mâchoires, le bras gauche ou les 2 bras et le dos, pâleur, malaise, sueurs, essoufflement, nausées, angoisse, fatigue inexplicable | ◆ Convulsions |
| | ◆ Hémorragie gastro-intestinale : rejet de sang par la bouche ou dans les selles, coloration des selles en noir |
| | ◆ Réactions cutanées graves : rougeur de la peau se généralisant à tout le corps, associée à des pustules et pouvant être accompagnée de fièvre |

Ces effets indésirables peuvent survenir quelles que soient la dose et la durée du traitement.

SI VOUS RESSENTEZ L'UN DE CES EFFETS INDÉSIRABLES, ARRÊTEZ VOTRE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN